

湖南省高等职业院校学生专业技能
抽查考试题库

护
理
专
业

岳阳职院护理学院

2011年9月

目 录

模块一	单人徒手心肺复苏术及生命体征测量	3
模块二	药物过敏试验（青霉素）及婴儿（新生儿）抚触	7
模块三	穿脱已使用过的隔离衣与手的消毒及肌肉注射	11
模块四	电动吸引器吸痰及口腔护理	14
模块五	导尿术（女患者）及外科洗手、穿手术衣及戴无菌手套	18
模块六	氧气筒给氧及卧有患者床更换床单	22
模块七	静脉采血技术（真空管采血法）及四部触诊	26
模块八	无菌技术操作及四肢绷带包扎	30
模块九	密闭式静脉输液及心电监护仪的使用	33

模块一 单人徒手心肺复苏术及生命体征测量

案例 1-1: 李群，男，48 岁，晨起后自觉胸闷不适，洗漱时出现左侧心前区疼痛，等待就诊时突发意识丧失，呼吸停止，小便失禁，脉搏测不到。既往体健。诊断：心源性猝死。

请根据以上案例完成下列任务：

1. 立即为患者实施徒手心肺复苏。
2. 复苏成功后为患者测量生命体征，即：体温、脉搏、呼吸、血压。

案例 1-2: 李勇，男，17 岁，在家处理电表故障时不慎被电击伤，当即出现意识丧失，呼吸停止，颈动脉搏动消失。诊断：电击伤猝死。

请根据以上案例完成下列任务：

1. 立即为患者实施徒手心肺复苏。
2. 复苏成功后为患者测量生命体征，即：体温、脉搏、呼吸、血压。

案例1-3: 李红平，女，32岁，因车祸导致脾破裂、失血性休克1小时急诊入院，在进行急诊术前准备的过程中，患者突然意识丧失，面色苍白，口唇四肢末梢严重发绀，脉搏、血压均测不出，心音消失，呼吸停止。诊断：失血性休克猝死。

请根据以上案例完成下列任务：

1. 立即为患者实施徒手心肺复苏。
2. 复苏成功后为患者测量生命体征，即：体温、脉搏、呼吸、血压。

案例 1-4: 张建波，男，47 岁，因冠心病收住心内科。在护理查房时发现患者突然意识丧失，呼吸停止，颈动脉搏动消失，血压测不出。诊断：心源性猝死。

请根据以上案例完成下列任务：

1. 立即为患者实施徒手心肺复苏。
2. 复苏成功后为患者测量生命体征，即：体温、脉搏、呼吸、血压。

案例1-5: 卢华，男，55岁，突感心前区不适，表情痛苦，随后倒地。体查：患者呼吸、心跳停止，血压、脉搏均测不出。既往有冠心病史。诊断：心源性猝死。

请根据以上案例完成下列任务：

1. 立即为患者实施徒手心肺复苏。
2. 复苏成功后为患者测量生命体征，即：体温、脉搏、呼吸、血压。

案例1-6: 陆晓辉，女，50岁，急性胆囊炎入院。今晨起床后，自觉胸闷不适，随后出现左侧胸部疼痛，面色苍白。体查：患者意识丧失，心跳停止，呼吸停止，血压、脉搏均测不出。诊断：心源性猝死。

请根据以上案例完成下列任务：

1. 立即为患者实施徒手心肺复苏。
2. 复苏成功后为患者测量生命体征，即：体温、脉搏、呼吸、血压。

案例 1-7: 李军，男，20岁，在校运动会跑完5000米比赛后突然晕倒，心跳、呼吸停止，颈动脉搏动未触及。诊断：猝死查因。

请根据以上案例完成下列任务：

1. 立即为患者实施徒手心肺复苏。
2. 复苏成功后为患者测量生命体征，即体温、脉搏、呼吸、血压。

案例 1-8: 王建平，男，62岁，农民，一天前劳动时自觉胸闷不适来我院就诊，在门诊大厅等候就诊过程中突感胸痛、出冷汗、抽搐，随即意识丧失，心跳、呼吸停止。患者既往有高血压、冠心病10余年。诊断：心源性猝死。

请根据以上案例完成下列任务：

1. 立即为患者实施徒手心肺复苏。
2. 复苏成功后为患者测量生命体征，即：体温、脉搏、呼吸、血压。

案例 1-9：付明，男，28 岁，在修理电视机时不慎被电击伤，当即出现意识丧失，心跳、呼吸停止，颈动脉搏动消失。诊断：电击伤猝死。

请根据以上案例完成下列任务：

1. 立即为患者实施徒手心肺复苏。
2. 复苏成功后为患者测量生命体征，即：体温、脉搏、呼吸、血压。

案例 1-10：叶红红，女，18 岁。因车祸导致颅脑损伤，内脏破裂伴失血性休克急诊入院。在急救过程中，患者突然面色苍白，意识丧失，呼吸停止，脉搏测不到。诊断：失血性休克猝死。

请根据以上案例完成下列任务：

1. 立即为患者实施徒手心肺复苏。
2. 复苏成功后为患者测量生命体征，即：体温、脉搏、呼吸、血压。

案例 1-11：张英，女，46 岁，因胸闷、气促、下肢水肿 2 天入院。入院后当天晚上 8 点 15 分，突然晕厥，呼吸、心跳停止，血压、脉搏均测不到。既往有扩张型心脏病 8 年余。诊断：心源性猝死。

请根据以上案例完成下列任务：

1. 立即为患者实施徒手心肺复苏。
2. 复苏成功后为患者测量生命体征，即：体温、脉搏、呼吸、血压。

案例 1-12：申亚坤，男，68 岁，在公园晨练时突发胸闷、心悸，随之跌倒在地、呼之不应，患者面色苍白，颈动脉搏动消失，呼吸停止。该患者患有肺源

性心脏病 6 年余。诊断：心源性猝死。

请根据以上案例完成下列任务：

1. 立即为患者实施徒手心肺复苏。
2. 复苏成功后为患者测量生命体征，即：体温、脉搏、呼吸、血压。

模块二 药物过敏试验（青霉素）及婴儿（新生儿）抚触技术

案例 2-1: 患儿，女，3 个月，因纳差、口腔黏膜充血水肿伴糜烂 3 天入院。3 天前发现患儿少吃、口腔黏膜充血水肿，逐渐加重伴口腔黏膜糜烂，1 天来发热、拒奶、精神差、哭声低。查：体温不升，R 34 次/分，P 130 次/分，口腔黏膜可见溃疡面，周围红晕，心肺正常。诊断为溃疡性口腔炎。医嘱予以青霉素抗感染治疗。

请根据以上案例完成下列任务：

- 1、为患儿配制青霉素皮试液，并进行皮试。
- 2、病情好转后为患儿进行婴儿抚触。

案例 2-2: 患儿，女，9 个月。因咳嗽 3 天、气促 2 天就诊。查：T 38℃，P 130 次/分，R 46 次/分。精神欠佳，轻喘，口周无发绀，有轻微的鼻翼扇动，双肺呼吸音粗，可闻及固定的中小湿啰音，HR 130 次/分，律齐音有力，腹部无异常征。X 线检查示肺纹理增重，两肺下野中内带出现点片状絮状影。诊断为支气管肺炎。医嘱予以青霉素抗感染治疗。

请根据以上案例完成下列任务：

1. 为患儿配制青霉素皮试液，并进行皮试。
2. 病情好转后为患儿进行婴儿抚触。

案例 2-3: 患儿，男，5 个月。发热、咳喘 5 天，加重 2 天入院。查体：T 39.2℃，P 148 次/分，R 36 次/分，精神较差，面色苍白，口周发绀，鼻翼扇动，咽部充血，呼吸急促。两肺有痰鸣音及密集的中细湿啰音。心音有力，律齐，肝右肋下 1cm，无压痛，腹部稍胀。X 线检查示两肺纹理增粗，有斑片状阴影。初步诊断为支气管肺炎。医嘱予以青霉素抗感染治疗。

请根据以上案例完成下列任务：

1. 为患儿配制青霉素皮试液，并进行皮试。
2. 病情好转后为患儿进行婴儿抚触。

案例 2-4: 患儿，男，剖宫产，术后母乳联合配方奶粉喂养，间断溢奶，第五天出现呼吸急促，呼吸音粗，R 58 次/分，HR 140 次/分，听诊无罗音及哮鸣音，出生至入院前无发热。胸片：肺纹理增多。诊断新生儿肺炎。医嘱予以青霉素抗感染治疗。

请根据以上案例完成下列任务：

1. 为患者配制青霉素皮试液，并进行皮试。
2. 病情好转后为患儿进行婴儿抚触。

案例 2-5: 患儿，男，6 个月。发热、咳嗽 4 天，伴气促 2 天来诊。查体：T 38.5℃，P 150 次/分，R 50 次/分，烦躁不安，呼吸急促，鼻翼扇动，口周发绀，双肺可闻及少量中、细湿啰音。X 线检查可见两肺散在的斑片状阴影。诊断为支气管肺炎。医嘱予以青霉素抗感染治疗。

请根据以上案例完成下列任务：

1. 为患者配制青霉素皮试液，并进行皮试。
2. 病情好转后为患儿进行婴儿抚触。

案例 2-6: 患儿，女，11 月，因犬吠样咳嗽、声嘶、发热 1 天入院。查：T 39℃，R 44 次/分，HR 136 次/分，律齐，无杂音。精神欠佳，唇红，咽部充血，扁桃体 2 度大，三凹征明显，双肺呼吸音粗，可闻及喉鸣音。腹平软，肝脏肋下可触及，肠鸣音正常。双下肢无水肿。胸片示双肺纹理增多。血常规示白细胞增高。诊断为急性感染性喉炎。医嘱予以青霉素抗感染治疗。

请根据以上案例完成下列任务：

1. 为患者配制青霉素皮试液，并进行皮试。
2. 病情好转后为患儿进行婴儿抚触。

案例 2-7: 患儿，男，11 个月，3 天前因感冒、流涕、轻微咳嗽诊断为上感，近 3 日咳嗽加重，发热，T 39.5℃，呼吸困难，发绀，两肺布满湿啰音，诊断为小儿肺炎。医嘱予以青霉素抗感染治疗。

请根据以上案例完成下列任务：

1. 为患者配制规格 400 万单位的青霉素皮试液。
2. 病情好转后为患儿行婴儿抚触。

案例 2-8: 患儿，男，8 个月，2 天前出现发热、咳嗽、痰多，继而咳嗽加剧，气喘，烦躁不安。查体：T 38.8℃，P 130 次/分，R 35 次/分，面色苍白，呼吸急促，双肺闻及散在干罗音及细湿罗音，心音中，肝脾不大。胸部 X 线显示双肺纹理增粗，有斑片状阴影。诊断为支气管肺炎。医嘱予以青霉素抗感染治疗。

请根据以上案例完成下列任务：

1. 为患者配制青霉素皮试液，并进行皮试。
2. 病情好转后为患儿进行婴儿抚触。

案例 2-9: 患儿，男，11 月，发病前 1 月有脓疱疮病史，已治愈。此次因眼睑浮肿 4 天，血尿 1 天入院。查：T 36.7℃，R 34 次/分，HR 126 次/分，BP 108/82mmHg，眼睑浮肿，精神欠佳，唇红，咽部充血，扁桃体不大，双肺呼吸音粗，无啰音。尿常规示 RBC++++/HP，Pro ++/HP，ASO(+)。诊断为急性肾炎。医嘱予以青霉素抗感染治疗。

请根据以上案例完成下列任务：

1. 为患者配制青霉素皮试液，并进行皮试。
2. 病情好转后为患儿进行婴儿抚触。

案例 2-10: 患儿，男，20 小时。因呼吸急促、拒乳 4 小时入院。患儿系 G₂P₂，孕 39 周，20 小时前在家出生，急产于充满羊水的便盆中。入院后发现小儿呼吸急促，呻吟，面色发青，拒乳。查：T 35℃，P 155 次/分，R 100 次/分，HR 155 次/分。X 检查示两肺纹理增粗，有点状阴影。诊断为新生儿吸入性肺炎。医嘱予以青霉素抗感染治疗。

请根据以上案例完成下列任务：

1. 为患者配制青霉素皮试液，并进行皮试。
2. 病情好转后为患儿进行新生儿抚触。

案例 2-11: 患儿，女，6 个月，因发热 3 天入院。3 天前不明原因出现发热，查：T 39.9℃，P 130 次 / 分，R 40 次 / 分，胸部 X 线检查见双肺纹理增粗，有点片状阴影沿肺纹理分布。诊断为支气管肺炎。医嘱予以青霉素抗感染治疗。

请根据以上案例完成下列任务：

1. 为患者配制青霉素皮试液，并进行皮试。
2. 病情好转后为患儿进行婴儿抚触。

案例 2-12: 患儿，女，10 个月。因发热、流涕、咳嗽 2 天入院。查：T 39.8℃，P 135 次/分，R 35 次/分，唇周青紫，鼻翼煽动，咽部充血。听诊双肺可闻及干湿啰音，胸片提示：双肺纹理增粗、紊乱，左下肺心缘旁有小片状阴影。诊断为支气管肺炎。医嘱予以青霉素抗感染治疗。

请根据以上案例完成下列任务：

1. 为患者配制青霉素皮试液，并进行皮试。
2. 病情好转后为患儿进行婴儿抚触。

模块三 穿脱已使用过的隔离衣与手的消毒及肌内注射

案例 3-1: 王杰, 男, 28 岁, 因食欲下降、巩膜黄染 10 天, 伴频繁恶心、呕吐、腹胀 5 天, 收入传染科, 诊断为重型乙型病毒性肝炎。医嘱: 胃复安 10mg im st。

请根据以上案例完成下列任务:

1. 穿、脱已使用过的隔离衣。
2. 肌内注射胃复安。

案例 3-2: 李琳, 女, 46 岁, 因高热、粘液脓血便伴里急后重 1 天收住传染科, 诊断为细菌性痢疾。医嘱: 复方氨基比林 2ml im st。

请根据以上案例完成下列任务:

1. 穿、脱已使用过隔离衣。
2. 肌内注射复方氨基比林。

案例 3-3: 秦汉, 男, 32 岁, 因体检发现“梅毒确认试验”阳性 1 天收入传染科, 诊断为梅毒 I 期, 青霉素皮试 (一), 医嘱: 氨苄星青霉素 0.5g im Bid。

请根据以上案例完成下列任务:

1. 穿、脱已使用过隔离衣。
2. 肌内注射氨苄星青霉素 1 次。

案例 3-4: 关小羽, 男, 6 岁, 因右肋部疱疹伴剧痛 2 日入院。体查: T 40℃, 双侧腮腺肿大, 收住传染科, 诊断为带状疱疹。医嘱: 强痛定 50mg im st。

请根据以上案例完成下列任务:

1. 穿、脱已使用过隔离衣。
2. 肌内注射强痛定。

案例 3-5: 刘大华, 女, 56 岁, 因突发畏寒发热、全身肌痛, 尤以腓肠肌疼痛为剧, 眼结膜充血 3 天, 头痛、呕吐 1 天入院, 查: T 39.1℃, 诊断为钩端

螺旋体病（脑膜炎型），青霉素皮试（一）。医嘱：青霉素 160 万^U im qd。

请根据以上案例完成下列任务：

1. 穿、脱已使用过隔离衣。
2. 肌内注射青霉素。

案例 3-6：李海，男，20 岁，因持续高热、表情淡漠、腹部不适、肝脾肿大和周围血象白细胞低下 2 天入院，诊断为伤寒，收入传染病房。医嘱：复方氨基比林 2ml im st。

请根据以上案例完成下列任务：

1. 穿、脱已使用过隔离衣。
2. 肌内注射氨基比林。

案例 3-7：陈洁，女，6 岁，因体温急剧上升至 39~40℃，伴头痛、恶心和呕吐，有嗜睡、颈项轻度强直 2 天收入传染科，诊断为流行性乙型脑炎后转入传染病房，医嘱：安定 5mg im st。

请根据以上案例完成下列任务：

1. 穿、脱已使用过隔离衣。
2. 肌内注射安定。

案例 3-8：许宏，女，16 岁，因高热、急性腹痛、腹泻 3 天收入传染科，诊断为霍乱查因。现患者并发肠穿孔，需手术治疗。医嘱：阿托品 0.5mg + 苯巴比妥 100mg im 术前 30 分钟。

请根据以上案例完成下列任务：

1. 穿、脱已使用过隔离衣。
2. 肌内注射阿托品及苯巴比妥。

案例 3-9：杨光，女，35 岁，因高热、头痛、腰痛 1 周，尿少伴蛋白尿血尿 1 天而入院，诊断为流行性出血热转入传染病房，经退热、补液后病情稍好转，医嘱：柴胡注射液 2ml im st。

请根据以上案例完成下列任务：

1. 穿、脱已使用过隔离衣。
2. 肌内注射柴胡注射液。

案例 3-10：马小四，男，67 岁，腹痛、频繁腹泻、排粘液脓血便、里急后重 3 天，查 T 41℃，腹软，无明显压痛、反跳痛，收入传染病区，初步诊断为细菌性痢疾。半小时前患者上半躯干出现大片红疹，医嘱：非那根 25mg im st。

请根据以上案例完成下列任务：

1. 穿、脱已使用过隔离衣。
2. 肌内注射非那根。

案例 3-11：黄华，男，30 岁。腿部被锈钉刺伤，后出现进食困难，四肢发硬，随后牙关紧闭，全身肌肉强直性收缩 1 天收入外科，诊断为破伤风。医嘱：安定 10mg im st。

请根据以上案例完成下列任务：

1. 穿、脱已使用过隔离衣。
2. 肌内注射安定。

案例 3-12：李惠誉，男，30 岁，因发热、腹痛、腹泻 3 天，粪便呈果酱样，有腐败腥臭，收入住传染科，诊断为阿米巴痢疾。医嘱：庆大霉素 8 万^U im Bid。

请根据以上案例完成下列任务：

1. 穿、脱已使用过隔离衣。
2. 肌内注射庆大霉素 1 次。

模块四 电动吸引器吸痰及口腔护理

案例 4-1: 夏聪，男，70 岁。因突发意识障碍，右侧肢体偏瘫半小时入院。T 37.4℃，P 98 次/分，R 34 次/分，BP 180/110 mmHg，浅昏迷，喉中痰鸣。经颅脑 CT 检查诊断为：脑出血（左内囊区）。医嘱：吸痰。

请根据以上案例完成下列任务：

1. 给患者吸痰。
2. 给患者进行口腔护理。

案例 4-2: 于龙，男，1 岁 2 个月。因急性腹痛 1 天入院，腹部检查明显压痛和肌紧张，麦氏点压痛明显，诊断为急性阑尾炎。术后第 3 天，出现咳嗽、咳痰。查 T 39℃，喉中痰鸣，右下肺闻及湿罗音，呼吸道内大量分泌物。医嘱：吸痰。

请根据以上案例完成下列任务：

1. 给患者吸痰。
2. 病情稳定后予患者行口腔护理。

案例 4-3: 王红，女，54 岁，因劳力性呼吸困难伴反复咳嗽、咳痰 15 年，加重 1 周入院，诊断为：风湿性心脏病二尖瓣狭窄。行二尖瓣置换术后 1 天，查：T 38.1℃，P 102 次/分，R 34 次/分，BP 120/85mmHg，浅昏迷，喉中痰鸣。医嘱：吸痰。

请根据以上案例完成下列任务：

1. 为患者吸痰。
2. 为患者行口腔护理。

案例 4-4: 李和, 男, 2 岁, 因咳嗽、咳痰 2 天, 喘息伴发绀 1 小时入院。
查体: T 38.2℃、P 150 次/分、R 56 次/分, 口唇发绀, 鼻扇、三凹征明显, 喉中痰鸣, 双肺可闻及大量细湿啰音, X 线示大小不等的片状阴影。诊断为: 支气管肺炎。医嘱: 吸痰。

请根据以上案例完成下列任务:

1. 为患者吸痰。
2. 为患者行口腔护理。

案例 4-5: 王晚, 女, 1 岁, 因咳嗽、痰多, 呼吸急促 2 小时入院, 查: T 39.1℃, P 102 次/分, R 34 次/分, BP 150/85mmHg, 神清, 喉中痰鸣, 发绀, 听诊肺部湿罗音。经胸部 X 线检查诊断为: 肺炎。医嘱: 吸痰。

请根据以上案例完成下列任务:

1. 为患者吸痰。
2. 为患者行口腔护理。

案例 4-6: 李盈, 女, 65 岁。慢性咳嗽、咳痰 20 余年。3 天前因受凉感冒后气促加重伴睡眠倒错入院, 查: T 39.1℃, P 100 次/分, R 36 次/分, BP 130/85 mmHg, 意识模糊, 皮肤、口唇发绀, 喉中痰鸣, 双肺有湿罗音, 诊断: 慢性支气管炎、肺气肿并肺性脑病。医嘱: 吸痰。

请根据以上案例完成下列任务:

1. 为患者吸痰。
2. 为患者行口腔护理。

案例 4-7: 李桂兰, 女, 69 岁, 因脑血管意外收住内科, 昏迷, 查: T 37.5℃, P88 次/分, R24 次/分, BP180/130mmHg, 听诊喉头及双肺痰鸣音多。医嘱: 吸痰。

请根据以上案例完成下列任务:

1. 为患者吸痰。
2. 为患者行口腔护理。

案例 4-8: 张完, 男, 20 岁, 因车祸头部损伤半小时入院, 诊断为: 硬膜下血肿。行颅内血肿清除术后, 麻醉尚未清醒, 喉中痰鸣, 生命体征尚平稳。医嘱: 吸痰。

请根据以上案例完成下列任务:

1. 为患者吸痰。
2. 为患者行口腔护理。

案例 4-9: 李平, 女, 69 岁, 因左侧肢体偏瘫, 昏睡 4 小时入院, 诊断为: 右侧脑梗塞。查: T 37.5 °C, P 88 次/min, R 24 次/min, BP 180/130mmHg, 浅昏迷, 听诊喉头有痰鸣音, 双肺可闻及湿性罗音。医嘱: 吸痰。

请根据以上案例完成下列任务:

1. 为患者吸痰。
2. 为患者行口腔护理。

案例 4-10: 周利, 男, 60 岁, 因鼾睡呼之不醒 1 小时入院, 诊断为: 脑出血。查: T 37.5 °C, P 88 次/min, R 24 次/min, BP 180/130 mmHg, 听诊喉头有痰鸣音。医嘱: 吸痰。

请根据以上案例完成下列任务:

1. 为患者吸痰。
2. 为患者行口腔护理。

案例 4-11: 张驰, 男, 73 岁, 因高热、咳嗽、咳痰、气促 2 天入院。查: T 39.4°C, P 104 次 / min, R 32 次 / min, BP 140 / 85 mmHg, 神清、发绀, 双肺

广泛湿罗音，喉头可闻及痰鸣音，咳嗽无力，诊断为 急性重症肺炎。医嘱：吸痰。

请根据以上案例完成下列任务：

1. 为患者吸痰。
2. 为患者行口腔护理。

案例 4-12：王敏，女，73 岁，因咳嗽、咳痰 30 年伴呼吸困难 3 天入院，入院诊断慢性支气管炎、阻塞性肺气肿、肺源性心脏病。查：T 39℃，喉中痰鸣，双肺有湿性罗音。医嘱：吸痰。

请根据以上案例完成下列任务：

1. 为患者吸痰。
2. 为患者行口腔护理。

模块五 导尿术（女患者）及外科洗手、穿手术衣及戴无菌手套

案例 5-1: 张玉，女，48 岁，因反复便秘、发现肛门脱出物 2 月入院，诊断为直肠脱垂，拟于今日 9am 在骶管阻滞麻醉下行直肠部分环切术。

请根据以上案例完成下列任务：

1. 为患者行术前导尿并留置导尿管。
2. 假设你是本台手术的器械护士，请做好术前准备（外科洗手、穿无菌手术衣及戴无菌手套）。

案例 5-2: 郑芳，女，28 岁，因宫内妊娠 39 周，B 超诊断脐带绕颈而入院，查：一般情况好，生命体征正常，无宫缩，未入盆，胎心率 146 次/分。拟于今日 10am 在连续硬膜外麻醉下行剖宫产术。

请根据以上案例完成下列任务：

1. 为患者行术前导尿并留置导尿管。
2. 假设你是本台手术的器械护士，请做好术前准备（外科洗手、穿无菌手术衣及戴无菌手套）。

案例 5-3: 杨平，女，48 岁，因体检时发现左侧乳房外上象限一 2×3cm 大小不规则肿块入院，经病理切片检查确诊为乳腺癌。拟于今 9am 在全麻下行左乳房切除及腋窝淋巴结清扫术。

请根据以上案例完成下列任务：

1. 为患者行术前导尿并留置导尿管。
2. 假设你是本台手术的器械护士，请做好术前准备（外科洗手、穿无菌手术衣及戴无菌手套）。

案例 5-4: 刘娜，女，25 岁，G₁P₁，妊娠 38 周，阵发性腹痛 16 小时，足月待产入院。查：BP 160/100mmHg，查宫口开大 3cm，头先露，胎膜未破，胎心率 110 次/分，拟立即在连续硬膜外麻醉下行剖宫产术。

请根据以上案例完成下列任务：

1. 为患者行术前导尿并留置导尿管。
2. 假设你是本台手术的器械护士，请做好术前准备（外科洗手、穿无菌手术衣及戴无菌手套）。

案例 5-5: 张霞，女，53 岁，因腹痛、腹泻伴消瘦半年入院，经检查诊断为：直肠黏膜管状腺癌。完善各项检查后，予肠道准备，拟于今日 10am 在全麻下行经腹-会阴切口直肠癌根治术。

请根据以上案例完成下列任务：

1. 为患者行术前导尿并留置导尿管。
2. 假设你是本台手术的器械护士，请做好术前准备（外科洗手、穿无菌手术衣及戴无菌手套）。

案例 5-6: 杨光，女，48 岁，因经量增多，经期延长 2 年，症状加重 6 个月入院。体查：贫血貌，子宫前位，约妊娠 5 个月大小，宫体表面呈结节感、质硬、宫体活动度好，无明显压痛。实验室检查：血红蛋白 82g/L。诊断为：子宫肌瘤。拟于今日 10am 行经腹子宫切除术。

请根据以上案例完成下列两项任务：

1. 为患者行术前导尿并留置导尿管。
2. 假设你是本台手术的器械护士，请做好术前准备（外科洗手、穿无菌手术衣及戴无菌手套）。

案例 5-7: 陈玲，女，52 岁，因今晨呕血 4 次，每次量约 150ml,经内科保守治疗无效转普外科，患者既往胃溃疡病史 10 余年。诊断：胃溃疡、上消化道出血。拟于今日 8am 在全麻下行胃大部分切除术。

请根据以上案例完成下列任务：

1. 为患者行术前导尿并留置导尿管。
2. 假设你是本台手术的器械护士，请做好术前准备（外科洗手、穿无菌手术衣及戴无菌手套）。

案例 5-8: 李小芳, 女, 28 岁, 妊娠 36 周, 因胎儿宫内窘迫需手术终止妊娠。拟于今日 10am 在连续硬膜外麻醉下行剖宫产术。

请根据以上案例完成下列任务:

1. 为患者行术前导尿并留置导尿管。
2. 假如你是本台手术的器械护士, 请做好术前准备 (外科洗手、穿无菌手术衣及戴无菌手套)。

案例 5-9: 刘佳, 女, 34 岁, 因反复发作性上腹部饥饿性疼痛 1 年, 伴腹痛难忍 2 小时入院, 诊断为十二指肠溃疡急性穿孔。拟急诊手术。请根据以上案例完成下列任务:

1. 为患者行术前导尿并留置导尿管。
2. 假设你是本台手术的器械护士, 请做好术前准备 (外科洗手、穿无菌手术衣及戴无菌手套)。

案例 5-10: 王姗姗, 女, 55 岁, 因“阴道不规则流血半年”入院, 诊断为子宫颈癌。现患者情绪稳定, 体温正常, 拟于今日 9am 在全麻下行子宫颈癌根治术。

请根据以上案例完成下列任务:

1. 为患者行术前导尿并留置导尿管。
2. 假设你是本台手术的器械护士, 请做好术前准备 (外科洗手、穿无菌手术衣及戴无菌手套)。

案例 5-11: 王小红, 女, 30 岁, 因体检时发现子宫肌瘤半年入院。入院后完善各项术前检查, 拟于今天 8:30am 在全麻下行腹腔镜子宫肌瘤切除术。

请根据以上案例完成下列任务:

1. 为患者行术前导尿并留置导尿管。
2. 假设你是本台手术的器械护士, 请做好术前准备 (外科洗手、穿无菌手术衣及戴无菌手套)。

案例 5-12: 刘茵，女，45 岁，因右侧腰部疼痛 5 天入院。诊断为右输尿管结石。入院后完善各项术前检查，并拟于今天 11am 在硬膜外麻下行输尿管镜下弹道碎石术。

请根据以上案例完成下列任务：

1. 为患者行术前导尿并留置导尿管。
2. 假设你是本台手术的器械护士，请做好术前准备（外科洗手、穿无菌手术衣及戴无菌手套）。

模块六 氧气筒给氧及卧有患者床更换床单

案例 6-1: 凌冲, 男, 28 岁, 车祸受伤 2 小时急诊入院。查: T 36.5℃, P114 次/min, R25 次/min, BP60/40mmHg。神志清楚, 口唇发绀, 呼吸急促, 烦躁不安, 脉搏细速, 四肢湿冷。诊断: 腹部损伤、脾破裂。医嘱予以吸氧 2~4L/min。脾破裂术后第 2 天, 生命体征平稳, 伤口渗血弄脏床单。

请根据以上案例完成下列任务:

1. 为患者行氧气筒给氧。
2. 为该卧床患者更换床单、被套等用物, 整理床单位。

案例 6-2: 刘容容, 女, 52 岁, 从楼梯摔下昏迷 1 小时后急诊入院。查: T38℃, P120 次/分, R40 次/分, Bp60/40mmHg, 大小便失禁, CT 显示“左侧颞叶出血”。诊断为: 脑损伤并左颞叶血肿。术后医嘱给予吸氧 2~4L/min, 2 天后, 患者生命体征平稳, 仍未清醒, 需要更换床上被服。

请根据以上案例完成下列任务:

1. 为患者行氧气筒给氧。
2. 为该卧床患者更换床单、被套等用物, 整理床单位。

案例 6-3: 王翔, 男, 38 岁, 因车撞伤后 1 小时入院, 查: 神志不清, T37℃, P110 次/分, R38 次/分, BP60/50mmHg, 左踝关节处见 10cm 长裂口, 诊断为: 左踝关节挫裂伤。医嘱给予吸氧 2~4L/min, 抢救之后, 患者苏醒, 伤口渗血较多, 污染了床单。

请根据以上案例完成下列任务:

1. 为患者行氧气筒给氧。
2. 为该卧床患者更换床单、被套等用物, 整理床单位。

案例 6-4: 杨月华, 男, 66 岁, 慢性咳嗽、咳痰、喘息 10 年, 加重三天入院。查: 神志恍惚, 躁动, 呼吸急促, 口唇发绀。诊断为慢性肺源性心脏病合并肺性脑病, 医嘱给予吸氧 1~2L/min, 几天后, 患者生命体征平稳, 活动能力差。

请根据以上案例完成下列任务:

1. 为患者行氧气筒给氧。
2. 为该卧床患者更换床单、被套等用物，整理床单位。

案例 6-5: 江兰，女，75 岁，因胸闷、气促 6 年，加重 5 天急诊入院。诊断为：慢性肺源性心脏病并右心功能不全。血气分析结果显示 PaO_2 44 mmHg， PaCO_2 67 mmHg。医嘱予以吸氧 2~4L/min。病情平稳后为患者更换床单位。

请根据以上案例完成下列任务：

1. 为患者行氧气筒给氧。
2. 为该卧床患者更换床单、被套等用物，整理床单位。

案例 6-6: 刘浩，男，65 岁，持续心前区疼痛 4 小时，伴左肩臂酸胀，自含硝酸甘油 1 片未见好转急诊入院。查：BP 160/90mmHg、出汗，口唇紫绀。既往有高血压病史 6 年，未规律治疗。诊断为冠心病心肌梗死。血气分析结果为 PaO_2 45mmHg， PaCO_2 62 mmHg。医嘱给予吸氧 2~4L/min，绝对卧床休息。

请根据以上案例完成下列任务：

1. 为患者行氧气筒给氧。
2. 为该卧床患者更换床单、被套等用物，整理床单位。

案例 6-7: 周中华，男，68 岁，因反复咳嗽、咳痰伴进行性呼吸困难 12 年，加重 3 天入院。查：T 38.1℃，P 108 次/分，R 30 次/分，BP 140/80mmHg，气促，发绀明显，烦躁不安，神智恍惚，不能平卧，痰黄色，粘稠，血气分析 PaO_2 48 mmHg， PaCO_2 65 mmHg。诊断为：慢性肺源性心脏病并肺性脑病。医嘱给予立即吸氧 1~2L/min。几天后，患者生命体征平稳，活动能力差。

请根据以上案例完成下列任务：

1. 为患者行氧气筒给氧。
2. 为该卧床患者更换床单、被套等用物，整理床单位。

案例 6-8: 李剑军，男，72 岁，因反复发作心前区疼痛 2 周，加重 3 天急诊入院，诊断为：冠心病，心绞痛，陈旧性心肌梗死。心电图显示左室肥厚并劳损，

T波低平。5年前有过急性心肌梗死病史。医嘱给予吸氧2~4L/min。病情平稳3天后，家属要求更换床上被服。

请根据以上案例完成下列任务：

1. 为患者行氧气筒给氧。
2. 为该卧床患者更换床单、被套等用物，整理床单位。

案例 6-9：李文波，男，74岁，因反复咳嗽、咳痰15年，呼吸困难3年，加重2天入院，诊断为：慢性阻塞性肺气肿（加重期）。今晨护士巡视病房，发现患者咳嗽、呼吸急促、大汗淋漓、咳粉红色泡沫痰，活动能力差，被褥污染。医嘱给予吸氧1~2L/min。

请根据以上案例完成下列任务：

1. 为患者行氧气筒给氧。
2. 待患者病情平稳后，为该卧床患者更换床单、被套等用物，整理床单位。

案例 6-10：严智，男，45岁，1年前因车祸导致截瘫，咳嗽，咳痰1星期，伴呼吸困难3天急诊入院。查：T 39.1℃，P 138次/分，R 30次/分，BP 140/80mmHg，痰黄色，粘稠，口唇明显紫绀，诊断为：1、肺炎；2、脊髓损伤截瘫。医嘱给予吸氧2~4L/min，病情平稳后，家属要求更换床单。

请根据以上案例完成下列任务：

1. 为患者行氧气筒给氧。
2. 为该卧床患者更换床单、被套等用物，整理床单位。

案例 6-11：王浩，男，75岁，因咳嗽、咳痰、气促三天急诊入院。查T 39.1℃，P102次/分，R28次/分，BP140/100mmHg，口唇紫绀，呼吸困难，神志清楚，但生活不能自理。医嘱给予吸氧2~4L/min。病情平稳后，家属要求更换床单。

请根据以上案例完成下列任务：

1. 为患者行氧气筒给氧。
2. 为该卧床患者更换床单、被套等用物，整理床单位。

案例 6-12: 王小凤，女，28 岁，孕 40 周，因呼吸急促 1 天入院待产。查 T 36.7℃，P112 次/分，R28 次/分，BP130/90mmHg，医嘱给予吸氧 2~4L/min。产后第 2 天，床单位被恶露污染。

请根据以上案例完成下列任务：

1. 为患者行氧气筒给氧。
2. 为该卧床患者更换床单、被套等用物，整理床单位。

模块七 静脉采血技术（真空管采血法）及四部触诊

案例 7-1: 何一，女，23 岁，停经 33 周，头痛 1 天，腹痛伴视物不清 4 小时，阴道少量流血 1 小时入院。查：T 37.0℃，P 86 次/min，R 25 次/min，BP 160/110 mmHg。诊断为：先兆子痫。医嘱予静脉采血查肝功能。

请根据以上案例完成下列任务：

1. 为该孕妇行静脉采血。
2. 孕妇病情稳定后，再为其行腹部四步触诊。

案例 7-2: 姜小，女，36 岁，已婚。妊 38⁺⁶ 周，转氨酶持续升高 3 个月余入院。查：T 36.8℃，P 76 次/min，R 20 次/min，BP 120/70 mmHg。肛门检查：宫口未开。医嘱予静脉采血查肝功能。

请根据以上案例完成下列任务：

1. 为该孕妇行静脉采血。
2. 为该孕妇做四步触诊。

案例 7-3: 肖丽丽，23 岁，女。G₁P₁，停经 37⁺⁴ 周，无诱因持续恶心呕吐 5 天，右上腹痛 3 天，2 天前家属发现其皮肤黄染，遂入院。查：T 37℃，P 96 次/min，R 17 次/min，BP 156/106 mmHg。面色苍白，巩膜轻度黄染，浅表淋巴结未触及，甲状腺不肿大。医嘱予静脉抽血查肝功能。

请根据以上案例完成下列任务：

1. 为该孕妇行静脉采血。
2. 为该孕妇做四步触诊。

案例 7-4: 张洁，初产妇，26 岁。停经 31 周，阴道血性分泌物 2 小时，轻微不规则阵发性腹痛 1 小时入院。查：T 36.3℃，P 86 次/min，R 20 次/min，BP 120/80 mmHg。心肺未见明显异常。羊水指数在 5.1~6.0cm。初步诊断：先兆早产、羊水过少、胎儿生长受限。医嘱予静脉抽血查 K⁺、Na⁺、Cl⁻、Ca²⁺。

请根据以上案例完成下列任务：

1. 为该孕妇行静脉采血。
2. 为该孕妇做四步触诊。

案例 7-5: 向莹, 女, 34 岁。宫内孕 24⁺周, 蛋白尿 4 月余入院。查: T 36.93℃, P 92 次/min, R 21 次/min, BP 140/95 mmHg。轻度贫血貌, 颜面部、双下肢无明显水肿, 心肺听诊无异常。初步诊断为妊娠合并慢性肾炎。医嘱予静脉抽血查 K⁺、Na⁺、Cl⁻、Ca²⁺。

请根据以上案例完成下列任务:

1. 为该孕妇行静脉采血。
2. 为该孕妇做四步触诊。

案例 7-6: 范方, 女, 27 岁。停经 7 月余, 头晕、乏力 2 月余, 下肢浮肿 1 月余。查: T 36.5℃, P 110 次/分, R 26 次/分, BP 105/60mmHg, 皮肤黏膜苍白。初步诊断为妊娠合并心脏病。医嘱予静脉抽血查肾功能。

请根据以上案例完成下列任务:

1. 为该孕妇行静脉采血。
2. 为该孕妇做四步触诊。

案例 7-7: 蔡路, 女, 32 岁。停经 27⁺5 周, 多饮、多食伴消瘦 1 月。已往月经规律, 停经 40 余天, B 超提示宫内早孕, 与孕周相符。停经四月余自觉胎动。行 B 超检查 2 次, 均正常。1 月前出现多饮、多食伴消瘦, 常感乏力, 今来院就诊。医嘱予静脉抽血查血糖。

请根据以上案例完成下列任务:

1. 为该孕妇行静脉采血。
2. 为该孕妇做四步触诊。

案例 7-8: 李兮, 女, 25 岁。停经 20 周, 腹部急剧增大伴呼吸困难半月。患者以往月经规律, 孕早期无明显不适, 近半月来自觉腹部急剧增大伴呼吸困

难，进食减少，便秘。B超提示：1.宫内妊娠臀位单活胎 2.急性羊水过多，建议进一步检查。医嘱予静脉抽血查肝功能。

请根据以上案例完成下列任务：

1. 为该孕妇行静脉采血。
2. 为该孕妇做四步触诊。

案例 7-9：刘丽，女，26岁。停经39周，因阵发性腹痛1小时来院就诊。产科门诊以G₁P₀宫内孕39周，活胎，先兆临产收住院。医嘱静脉抽血查凝血全套。

请根据以上案例完成下列任务：

1. 为该孕妇行静脉采血。
2. 为该孕妇做四步触诊。

案例 7-10：赵萍，女，30岁。停经7月余来院检查，患者G₂P₁，以往月经规律，停经4月时感胎动，孕期无明显不适，此前未在医院进行产前检查。医嘱静脉抽血查凝血全套。

请根据以上案例完成下列任务：

1. 为该孕妇行静脉采血。
2. 为该孕妇做四步触诊。

案例 7-11：秦兰，女，28岁。停经31⁺²周，皮肤瘙痒半月。患者以往月经规律，孕早期无明显不适，半月前开始出现小腿皮肤瘙痒，进而蔓延至大腿及上肢，夜间加重，偶有恶心、呕吐，遂来院就诊。查：T 36.5℃，P 98次/分，R 20次/分，BP 120/80mmHg，皮肤黏膜无黄染，上肢及大腿皮肤见抓痕。医嘱静脉抽血查肝、肾功能。

请根据以上案例完成下列任务：

1. 为该孕妇行静脉采血。
2. 为该孕妇做四步触诊。

案例 7-12: 曾敏，女，30 岁。停经 39^{+3} 周，无明显不适，足月待产要求剖宫产入院。查：T 36.5°C ，P 96 次/分，R 20 次/分，BP 110/75mmHg。医嘱静脉抽血查凝血全套。

请根据以上案例完成下列任务：

1. 为该孕妇行静脉采血。
2. 为该孕妇做四步触诊。

模块八 无菌技术操作及四肢绷带包扎

案例 8-1: 田伟, 男, 50 岁, 工人, 因电锯割伤右前臂尺侧中段 1 小时急诊入院, 诊断为: 右前臂裂伤。患者神志清楚, 痛苦面容, 查右前臂尺侧创口长约 8cm, 肌肉组织外露, 流血不止。

请根据以上案例完成下列任务:

1. 按无菌操作原则准备用物 (单巾铺盘、双巾铺盘)。
2. 待医生清创后, 请你为患者包扎右前臂伤口。

案例 8-2: 张新, 男, 20 岁, 被摩托车撞倒 1 小时急诊抬送入院, 诊断为: 右下肢挫裂伤。查: 患者神志清楚, 痛苦面容, 右下肢活动受限, 流血不止。

请根据以上案例完成下列任务:

1. 按无菌操作原则准备用物 (单巾铺盘、双巾铺盘)。
2. 待医生清创后, 请你为患者包扎右下肢伤口。

案例 8-3: 张文, 女, 38 岁。意外事故致左胫腓骨受伤 1 小时急诊入院, 诊断为: 左侧小腿挫裂伤。查: 左小腿青紫、肿胀、出血。

请根据以上案例完成下列任务:

1. 按无菌操作原则准备用物 (单巾铺盘、双巾铺盘)。
2. 待医生清创后, 请你为患者包扎左下肢伤口。

案例 8-4: 周强, 男, 14 岁, 踢足球时后仰摔伤右肘关节半小时入院, 查: 右上肢发现约 4cm 的伤口, 伴出血、疼痛、肿胀。诊断为: 右肘关节挫裂伤。

请根据以上案例完成下列任务:

1. 按无菌操作原则准备用物 (单巾铺盘、双巾铺盘)。
2. 待医生清创后, 请你为患者包扎右上肢伤口。

案例 8-5: 王华丽, 女, 30 岁, 因车祸受伤 1 小时急诊入院, 查: 神志清楚, 呼吸、血压、脉搏正常, 口腔未见明显异物和出血, 左上肢前臂中段见 8cm×3cm 创面, 出血量较多。诊断为: 左前臂挫裂伤。

请根据以上案例完成下列任务：

1. 按无菌操作原则准备用物（单巾铺盘、双巾铺盘）。
2. 待医生清创后，请你为患者包扎左前臂伤口。

案例 8-6：张丽，女，22 岁，不慎右脚踏空致右踝关节扭伤，疼痛难忍 1 小时入院。查：右侧外踝处肿胀、青紫、出血，没有明显的骨折征象。诊断为：右踝关节挫裂伤。

请根据以上案例完成下列任务：

1. 按无菌操作原则准备用物（单巾铺盘、双巾铺盘）。
2. 待医生清创后，请你为患者包扎右踝关节伤口。

案例 8-7：张方，男，26 岁，施工时不慎摔倒，右肘部落地，当即右上肢感剧痛，血流不止 1 小时急诊入院。查：右前臂有 5cm×2cm 伤口。诊断为：右前臂挫裂伤。

请根据以上案例完成下列任务：

1. 按无菌操作原则准备用物（单巾铺盘、双巾铺盘）。
2. 待医生清创后，请你为患者包扎右上肢伤口。

案例 8-8：李军，男，32 岁，被摩托车撞伤致右腿剧烈疼痛 1 小时急诊入院，查：右大腿有 8cm×2cm 伤口，出血不止。诊断为：右大腿挫裂伤。

请根据以上案例完成下列任务：

1. 按无菌操作原则准备用物（单巾铺盘、双巾铺盘）。
2. 待医生清创后，请你为患者包扎右下肢伤口。

案例 8-9：刘敏，女，18 岁，不慎被锐物划伤左小腿，血流不止半小时急诊入院。查：神志清楚，痛苦面容，左小腿外侧有 5cm 长的伤口。诊断为：左小腿裂伤。

请根据以上案例完成下列任务：

1. 按无菌操作原则准备用物（单巾铺盘、双巾铺盘）。
2. 待医生清创后，请你为患者包扎左下肢伤口。

案例 8-10：王健，男，35 岁，左手背侧腱鞘囊肿切除术后第一天，切口敷料滑脱及少许渗血。诊断为：左手腱鞘囊肿术后。

请根据以上案例完成下列任务：

1. 按无菌操作原则准备用物（单巾铺盘、双巾铺盘）。
2. 待医生清创后，请你为患者包扎左手伤口。

案例 8-11：杨扬，男，21 岁，骑摩托车时发生车祸致四肢剧烈疼痛 1 小时急诊入院。查：神志清楚，急性痛苦面容，右前臂、左上臂外侧擦伤，局部渗血，左上肢内侧有 8cm 长的伤口，出血不止。诊断为：双上肢多处挫裂伤。

请根据以上案例完成下列任务：

1. 按无菌操作原则准备用物（单巾铺盘、双巾铺盘）。
2. 待医生清创后，请你为患者包扎双上肢伤口。

案例 8-12：许莉莉，女，37 岁，骑自行车发生车祸致双腿剧烈疼痛 1 小时急诊入院。查：右大腿中段内侧有 5cm 长伤口，出血不止，左小腿外侧有 6cm 长伤口，少许渗血。诊断为：双下肢多处挫裂伤。

请根据以上案例完成下列任务：

1. 按无菌操作原则准备用物（单巾铺盘、双巾铺盘）。
2. 待医生清创后，请你为患者包扎双下肢伤口。

模块九 密闭式静脉输液及心电监护仪的使用

案例 9-1: 王群, 女, 6 岁, 因反复心前区不适、心悸半年入院, 诊断为先天性心脏病、房间隔缺损。局麻下行房间隔缺损封堵术, 术程顺利, 术后回到病房。医嘱予 5%GS 100ml + 头孢拉定 2g ivgtt 20 滴/分; 并予以心电监护。

请根据以上案例完成下列任务:

1. 为患者实施密闭式静脉输液。
2. 为患者连接心电监护仪。

案例 9-2: 曾强, 男, 57 岁, 因胸闷、气短、活动耐力下降伴双下肢水肿 3 月入院, 诊断为扩张型心肌病、心律失常。医嘱予 5%GS 250ml + 硝酸甘油 10mg ivgtt st, 30 滴/分; 并予心电监护。

请根据以上案例完成下列任务:

1. 为患者实施密闭式静脉输液。
2. 为患者连接心电监护仪。

案例 9-3: 李小平, 男, 65 岁, 因反复上腹部疼痛 5 年伴呕吐 24 小时急诊入院。诊断为胃溃疡伴幽门梗阻。在全麻下行毕 II 式胃大部切除术, 术后自感胸闷、心悸。医嘱予 10%GS 500ml + 维生素 C 2.0, ivgtt st, 30 滴/分; 并予心电监护。

请根据以上案例完成下列任务:

1. 为患者实施密闭式静脉输液。
2. 为患者连接心电监护仪。

案例 9-4: 刘建军, 男, 60 岁, 因做家务时突发心前区疼痛, 伴胸闷、气促 2 小时急诊入院, 诊断为急性心肌梗死。医嘱予 10%GS 100ml + UK (尿激酶) 150 万^U ivgtt st, 60 滴/分; 并予心电监护。

请根据以上案例完成下列任务:

1. 为患者实施密闭式静脉输液。

2. 为患者连接心电监护仪。

案例 9-5: 王路, 男, 64 岁, 突发心前区疼痛 1 小时, 入院诊断为急性心肌梗死, 收住心血管内科 CCU。医嘱予 10%GS 100ml + UK (尿激酶) 150 万^U ivgtt st, 40 滴/分; 并予心电监护。

请根据以上案例完成下列任务:

1. 为患者实施密闭式静脉输液。
2. 为患者连接心电监护仪。

案例 9-6: 刘围, 男, 47 岁, 突发心悸、气促半小时入院。心电图示“阵发性室性心动过速”, 诊断为心律失常。医嘱予 5%GS 250ml + 利多卡因 5ml ivgtt st, 40 滴/分; 并予心电监护。

请根据以上案例完成下列任务:

1. 为患者实施密闭式静脉输液。
2. 为患者连接心电监护仪。

案例 9-7: 李明, 男, 56 岁, 胸闷、气促伴双下肢水肿 2 月, 加重 5 天急诊入院, 诊断为急性心包炎。医嘱予 NS 100ml + 头孢拉定 3.0g ivgtt Bid 40 滴/分, 心包穿刺术中和穿刺后 2 小时心电监护。

请根据以上案例完成下列任务:

1. 为患者实施密闭式静脉输液。
2. 为患者连接心电监护仪。

案例 9-8: 吴德华, 女, 78 岁, 因右上腹疼痛半年, 加重一周入院, 诊断为: 胆囊结石。腹腔镜胆囊切除术后送至病房, 既往有冠心病史。医嘱予 NS 100ml + 头孢拉定 3.0g ivgtt Bid 40 滴/分, 并予心电监护。

请根据以上案例完成下列任务:

1. 为患者实施密闭式静脉输液。
2. 为患者连接心电监护仪。

案例 9-9: 周磊, 男, 50 岁。突发心前区压榨性疼痛 2 小时入院, 诊断为急性心肌梗死。医嘱予 10%GS 100ml + UK (尿激酶) 150 万^U ivgtt st, 60 滴/分, 并予心电监护。

请根据以上案例完成下列任务:

1. 为患者实施密闭式静脉输液。
2. 为患者连接心电监护仪。

案例 9-10: 张兰, 女, 58 岁。突发头痛、右侧肢体无力, 继而意识丧失倒地半小时急诊入院。查: 神志不清, 双侧瞳孔等大等圆, 对光反射迟钝, 鼾声呼吸, 血压 190/105mmHg, 诊断为脑出血。医嘱予甘露醇 250ml ivgtt st, 100 滴/分, 并予心电监护。

请根据以上案例完成下列任务:

1. 为患者实施密闭式静脉输液。
2. 为患者连接心电监护仪。

案例 9-11: 张强, 男, 55 岁, 突发心前区持续剧烈疼痛, 伴烦躁不安、大汗、精神紧张、恐惧 1 小时急诊入院。有冠心病病史 10 年。查: BP 80/60mmHg, P 110 次/min, R 24 次/分, 四肢末梢湿冷, 脉搏细速。心电图示 V₁~V₅ 导联 Q 波宽深, ST 段呈弓背上抬。临床诊断急性心肌梗死。医嘱予 10%GS 100ml + UK (尿激酶) 150 万^U ivgtt st, 50 滴/分, 并予心电监护。

请根据以上案例完成下列任务:

1. 为患者实施密闭式静脉输液。
2. 为患者连接心电监护仪。

案例 9-12: 李林, 男, 27 岁, 因严重外伤致意识丧失, 现场立即进行心肺复苏, 神志恢复后送医院抢救, 诊断为: 脑损伤, 心肺复苏术后。医嘱予 NS 100ml + 头孢拉定 3.0g ivgtt Bid 40 滴/分, 并予以心电监护。

请根据以上案例完成下列任务:

1. 为患者实施密闭式静脉输液。

2. 为患者连接心电监护仪。